

CHECK LIST

DEI PESCI D'ACQUA DOLCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

di Sergio Paradisi



La lista comprende le specie d'acqua dolce in senso stretto e quelle specie che trascorrono nelle acque dolci solo parte del ciclo vitale in forza di una migrazione riproduttiva obbligata. Sono state inserite poi alcune specie che abitano di norma le acque salmastre di lagune e foci ma che sono in grado, occasionalmente, di compiere l'intero ciclo vitale nelle acque dolci. Si è ritenuto infine di inserire le specie cosiddette *di rimonta*, ovvero quelle specie marine costiere che non si riproducono in acqua dolce ma che risalgono abitualmente i corsi d'acqua per motivi trofici anche per svariati chilometri e che sono quindi reperibili comunemente nei tratti terminali dei fiumi.

Sono incluse nella lista le specie autoctone e quelle specie alloctone per le quali vi siano almeno 5 segnalazioni negli ultimi 10 anni. Non vengono pertanto accolte specie segnalate in vecchi lavori e successivamente non confermate, come *Leuciscus illyricus*, *Sander lucioperca*, *Blennius fluviatilis* (sin. *Salaria fluviatilis*), tutte citate da Heckel & Kner (1858) per l'Isonzo. *Petromyzon planeri* e *Petromyzon fluviatilis* citate da Tellini (1895), vanno entrambe ricondotte a *Lampetra zanadreae*, descritta per la prima volta nel 1955. Esclusa anche *Hypophthalmichthys nobilis*, raccolta un'unica volta sul territorio regionale alle foci dell'Isonzo (Mojetta e Dolce, 1986).

La nomenclatura usata è in accordo con Zerunian (2004). Un'avvertenza per le specie del genere *Salmo*: considerazioni zoogeografiche e indagini genetiche stanno portando a una revisione della posizione tassonomica delle popolazioni europee di *Salmo trutta* (e quindi anche delle trote italiane) con la probabile separazione a livello specifico delle popolazioni atlantiche, mediterranee e danubiane; anche se già si incontrano denominazioni come *Salmo mediterraneus mediterraneus* (trota fario mediterranea) e *Salmo mediterraneus marmoratus* (trota marmorata) - che pure sembrano ben giustificate - nella lista si è ritenuto di mantenere per ora la classificazione in uso.

I nomi comuni delle specie endemiche o subendemiche in Italia sono indicati in **neretto**. Compaiono inoltre i seguenti simboli:

- ↑ specie migratrice anadroma, risale dal mare per riprodursi;
- ↓ specie migratrice catadroma, scende in mare per riprodursi;
- A1 specie alloctona acclimatata, si riproduce regolarmente nelle acque dolci della regione;
- A2 specie alloctona solo parzialmente acclimatata, si riproduce in modo molto localizzato;
- A3 specie alloctona non acclimatata, riproduzione finora mai accertata nelle acque regionali;
- ↑ specie marina costiera di rimonta, risale i fiumi per motivi trofici;
- ↔ specie di acque salmastre in grado di riprodursi occasionalmente in acque dolci;
- * specie storica, di cui non si hanno più notizie certe di presenza da almeno cinquant'anni;
- ** specie introdotta in epoca imperiale romana;
- *** specie autoctona solo nelle acque del Tarvisiano (bacino danubiano).

CYCLOSTOMATA

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
Lampetra zanandreae Vladykov, 1955

Lampreda di mare ↑
Lampreda padana



OSTEICHTHYES

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Acipenser naccarii Bonaparte, 1836

Storione * ↑
Storione cobice ↑

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Anguilla ↓

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa fallax (Lacépède, 1803)

Alosa o Cheppia ↑

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Rutilus pigus (Lacépède, 1804)
Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus souffia muticellus Bonaparte, 1837
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844)
Chondrostoma soetta Bonaparte, 1836
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Barbus plebejus Bonaparte, 1836
Barbus meridionalis caninus Bonaparte, 1839
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Pseudorasbora parva (Heckel e Kner, 1858)
Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844)
Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Pigo
Triotto
Cavedano
Vairone
Sanguinerola
Tinca
Scardola
Alborella
Savetta
Naso **A1**
Lasca
Gobione
Barbo
Barbo canino
Carpa ** **A1**
Rodeo **A1**
Pseudorasbora **A1**
Carpa erbivora **A3**
Abramide **A3**
Carassio **A1**
Carassio dorato **A1**
Ido **A3**

Cobitidae

Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865
Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)

Cobite
Cobite mascherato

Balitoridae

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Cobite barbatello

ESOCIFORMES

Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758

Luccio

SILURIFORMES

Ictaluride

Ameiurus melas (Rafinesque, 1818)
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
Ameiurus natalis (Lesueur, 1819)
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)

Pesce gatto **A1**
Pesce gatto nebuloso **A1**
Pesce gatto giallo **A1**
Pesce gatto punteggiato **A3**

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----|
| Siluridae | | | |
| <i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758 | Siluro | | A1 |
| SALMONIFORMES | | | |
| Salmonidae | | | |
| <i>Salmo (trutta) trutta</i> Linnaeus, 1758 | Trota fario *** | | A1 |
| <i>Salmo (trutta) marmoratus</i> Cuvier, 1817 | Trota marmorata | | |
| <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792) | Trota iridea | | A2 |
| <i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758) | Coregone | | A3 |
| <i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758) | Salmerino alpino | | A1 |
| <i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814) | Salmerino di fonte | | A2 |
| <i>Thymallus thymallus</i> | Temolo | | |
| MUGILIFORMES | | | |
| Mugilidae | | | |
| <i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758 | Cefalo | | ↑ |
| <i>Liza ramada</i> (Risso, 1826) | Muggine calamita | | ↑ |
| <i>Liza aurata</i> (Risso, 1810) | Muggine dorato | | ↑ |
| <i>Liza saliens</i> (Risso, 1810) | Muggine musino | | ↑ |
| <i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1826) | Muggine labbrone | | ↑ |
| ATHERINIFORMES | | | |
| Atherinidae | | | |
| <i>Atherina boyeri</i> Risso, 1810 | Latterino | | |
| CYPRINODONTIFORMES | | | |
| Cyprinodontidae | | | |
| <i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821) | Nono | | ↔ |
| Poeciliidae | | | |
| <i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859 | Gambusia | | A1 |
| GASTEROSTEIFORMES | | | |
| Gasterosteidae | | | |
| <i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758 | Spinarello | | |
| Syngnathidae | | | |
| <i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758 | Pesce ago | | ↑ |
| <i>Syngnathus abaster</i> Risso, 1810 | Pesce ago di rio | | ↔ |
| SCORPAENIFORMES | | | |
| Cottidae | | | |
| <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Scazzone | | |
| PERCIFORMES | | | |
| Moronidae | | | |
| <i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758) | Spigola | | ↑ |
| Percidae | | | |
| <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | Persico reale | | |
| <i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758) | Acerina | | A2 |
| Sparidae | | | |
| <i>Sparus auratus</i> Linnaeus, 1758 | Orata | | ↑ |
| Centrarchidae | | | |
| <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | Persico sole | | A1 |
| <i>Micropterus salmoides</i> Lacépède, 1802 | Persico trota | | A1 |
| Gobidae | | | |
| <i>Pomatoschistus canestrini</i> (Ninni, 1883) | Ghiozzetto cenerino | | ↔ |
| <i>Knipowitschia panizzeae</i> (Verga, 1841) | Ghiozzetto di laguna | | ↔ |
| <i>Knipowitschia punctatissima</i> (Canestrini, 1864) | Panzarolo | | |
| <i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1811) | Ghiozzo gô | | ↑ |
| <i>Padogobius martensii</i> (Günther, 1861) | Ghiozzo padano | | |
| PLEURONECTIFORMES | | | |
| Pleuronectidae | | | |
| <i>Platichthys flesus italicus</i> (Günther, 1862) | Passera | | ↑ |